

- GRABIŃSKI W. 1991. Sierpówka – *Streptopelia decaocto* (Friv., 1838). In: DYRCZ A., GRABIŃSKI W., STAWARCZYK T., WITKOWSKI J. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
- KUŹNIAK S. 1996. Atlas ptaków lęgowych Leszna w latach 1990-1993. Prace Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM 6: 1-83.
- RACHEL M. 2002. Nietypowe umieszczenie gniazda przez sierpówkę *Streptopelia decaocto*. Przegl. Przyr. 13, 1-2: 271.
- STÓJ M., DYCZKOWSKI J. 2002. Ptaki Jasła – liczebność, rozmieszczenie i ochrona. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
- TOMIAŁOJĆ L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „proNatura”, Wrocław.

Summary

In the years 2004 and 2005 untypically located nests of the Collared Turtle Dove were searched for. Eight such instances were found: 4 on traffic lights, 2 on a street lamp post and 2 on wall-fixed elements. All the nests located on the traffic lights were designed in the same way, which supports a thesis of the imprinting phenomenon occurring in the population.

Dariusz Szyra

OBSERWACJA BERNIKLI RDZAWOSZYJEJ *BRANTA RUFICOLLIS* NA ZIEMI LUBUSKIEJ

Recording of the Red-Breasted Goose *Branta ruficollis* in Lubuska Land

Dnia 05.05.2003 r. prowadząc obserwacje ptaków w Parku Narodowym „Ujście Warty” (pow. Sulęcín, woj. lubuskie), na terenie zalewowym Obwodu Ochronnego Słońsk, w stadzie gęgaw *Anser anser* liczącym kilkadziesiąt osobników zauważyłem dwie dorosłe bernikle rdzawoszyje. Ptaki odpoczywały, stojąc w płytkiej wodzie niedaleko brzegu, w rejonie końcowego odcinka tzw. betonki. Po trzydziestominutowej obserwacji, z najmniejszej odległości ok. 60 m, zerwały się do lotu (celowo przeze mnie splotzone) i siadły ponownie kilkadziesiąt metrów dalej, by następnie po dłuższej chwili znów wzbić się w powietrze. Po okrążeniu rozlewiska zniknęły z pola widzenia. Obserwacja została zaakceptowana przez Komisję Faunistyczną. Jest to pierwsze stwierdzenie gatunku na Ziemi Lubuskiej (Jermaczek et al. 1995, Czechowski et al. 2004).

Bernikla rdzawoszyja gniazduje na małym obszarze w tundrze i lasotundrze zachodniej Syberii – na wschód od rzeki Ob do Półwyspu Tajmyr, a zimuje nad Morzem Czarnym, Kaspijskim i Aralskim (Flint et al. 1984). W Europie główne zimowiska znajdują się przede wszystkim w Rumunii, a mniej liczne w Bułgarii i północno-wschodniej Grecji (Cramp 1988). W okresie prze-

lotów widywana dość regularnie w zachodniej i środkowej Europie; ptaki, które oderwały się od swojego stada, często dołączają do stad innych gęsi wędrujących na zachód.

Ta rzadka i oryginalnie ubarwiona gęś do Polski zalatuje sporadycznie, dotychczas stwierdzona 68 razy (N os. = 164) (Komisja Faunistyczna 2005). Od lat 90. zaczęła pojawiać się niemal corocznie we wzrastającej liczbie, a obserwacje jesienne zaczęły przeważać nad wiosennymi, natomiast miejscem najregularniejszych spotkań jest dolina Baryczy (Witkowski et al. 1995, Dyrz et al. 1998, Tomiałoć i Stawarczyk 2003). Przedstawione stwierdzenie jest jedną z najpóźniejszych obserwacji tego gatunku w okresie wiosennym na terenie Polski (Tomiałoć i Stawarczyk 2003). Najprawdopodobniej te same dwa osobniki widziano później k. Rewy nad Zatoką Pucką (Komisja Faunistyczna 2004).

LITERATURA

- CRAMP S. (Ed.). 1988. Handbook of Birds of Europe, the Middle East and North Africa. Vol. 1. Oxford University Press, Oxford.
- CZECHOWSKI P., BOCHENSKI M., JĘDRO G., KAJZER Z., RUBACHA S., SIDELNIK M., WĄSICKI A. 2004. Rzadkie gatunki ptaków obserwowane w województwie lubuskim w latach 1990-2004. Not. Orn. 45: 241-253.
- DYRCZ A., KOŁODZIEJCZYK P., MARTINI K., MARTINI M. 1998. Ptaki Zbiornika Mietkowskiego. Ptaki Śląska 12: 17-80.
- FLINT V. E., BOEHME R. L., KOSTIN Y. V., KUZNETSOV A. A. 1984. A Field Guide to Birds of the USSR. Princeton.
- JERMACZEK A., CZWAŁGA T., JERMACZEK D., KRZYŚKÓW T., RUDAWSKI W., STAŃKO R. 1995. Ptaki Ziemi Lubuskiej. Monografia faunistyczna. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.
- KOMISJA FAUNISTYCZNA 2004. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2003. Not. Orn. 45: 169-194.
- KOMISJA FAUNISTYCZNA 2005. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2004. Not. Orn. 46: 157-178.
- TOMIAŁOJĆ L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”. Wrocław.
- WITKOWSKI J., ORŁOWSKA B., RANOSZEK E., STAWARCZYK T. 1995. Awifauna doliny Baryczy. Not. Orn. 36: 5-74.

Summary

On 5th of May 2003 in National Park River Warta Estuary (District of Sulęcín, Lubuskie Province) two adult red-breasted geese were observed. This was the first recording of the species in Lubuska Land. The recording was approved by the Faunal Committee.