

Justyna Barteczka, Bogdan Rudzioneł

LETNIA OBSERWACJA KAZARKI RDZAWEJ *TADORNA FERRUGINEA* W DOLINIE ŚRODKOWEJ NOTECI

Summer observation of Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea* in the valley of middle Noteć River

Doroślą samicę kazarki rdzawej *Tadorna ferruginea* obserwowaliśmy 25.06.2006 r. w kompleksie stawów hodowlanych Smogulec (gmina Gołańcz, woj. wielkopolskie). Ptak przebywał w stadzie ok.150 krzyżówek i 7 gęgaw. Był bardzo niespokojny, często zrywał się do lotu i przemieszczał się na sąsiednie stawy. Według Tomiałojcia i Stawarczyka (2003) kazarkę najczęściej spotyka się w miesiącach letnich. Obserwacja uzyskała akceptację Komisji Faunistycznej (nr 9107).

LITERATURA

TOMIAŁOJC L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP „pro Natura”, Wrocław.

Summary

An adult female of Ruddy Shelduck was observed on 25th June 2006 in the complex of fishponds in Smogulec (commune of Gołańcz; Wielkopolskie Province) . The observation obtained an acceptance by Fauna Commission.

Sławomir Rubacha

OBSERWACJE BERNIKLI RDZAWOSZYJEJ *BRANTA RUFICOLLIS* W PARKU NARODOWYM „UJŚCIE WARTY”

Recordings of the Red-breasted Goose *Branta ruficollis* in ‘Ujście Warty’ National Park

Jesienią 2006 roku dokonano kilku obserwacji bernikli rdzawoszyjej *Branta ruficollis* na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. 25.10.2006 r. zaobserwowano pojedynczego młodocianego osobnika (S. Rubacha). Dzień później, tj. 26.10. widziano już 3 ptaki (1 ad. i 2 juv.) (S. Rubacha, P. Czechowski, G. Jędro). Kolejne obserwacje miały

miejsce 09.11. – 1 juv. (S. Rubacha) oraz 19.11. – 1 os. (T. Grabowski, M. Fedorowicz). Wszystkie powyższe obserwacje dotyczą prawdopodobnie tych samych osobników. Ptaki przebywały wraz z innymi gatunkami gęsi: gęsi zbożowych *Anser fabalis*, gęsi białoczelnych *Anser albifrons*, gęgawy *Anser anser* oraz bernikli białoliczych *Branta leucopsis*. Wykonano szereg zdjęć dokumentacyjnych. Obserwacje otrzymały akceptację Komisji Faunistycznej.

Dotychczas w województwie lubuskim bernikłę rdzawoszyją stwierdzono trzykrotnie. Wszystkie obserwacje również dotyczyły terenu PN „Ujście Warty”. Pierwsze stwierdzenie miało miejsce 29.11.1996 roku - 1os. (Komisja Faunistyczna 1997), następnie, 2 dorosłe osobniki widziano 05.05.2003r. (Komisja Faunistyczna 2004) oraz jednego ptaka widziano 22.03.2005r. (S. Rubacha, Z. Kajzer).

W Polsce gatunek ten można najczęściej spotkać w dolinie Baryczy w trakcie jesienno-wiosennych przelotów, zimuje sporadycznie, dotychczas stwierdzono 8 takich przypadków (Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Główne lęgowiska bernikli rdzawoszyjej znajdują się w zachodniej Syberii, natomiast zimowiska nad Morzem Kaspijskim i Zatoką Perską (Cramp 1998).



LITERATURA

CRAMP S. (Ed.) 1998. The Birds of the Western Palearctic. CD-ROM Version 1.0. Oxford University Press.

Komisja Faunistyczna 1997. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1996. Not. Orn. 33: 291-311.

Komisja Faunistyczna 2004. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2003. Not. Orn. 33: TOMIAŁOJĆ L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP „pro Natura”, Wrocław.

Summary

In autumn 2006 four recordings were made of the Red-breasted Goose *Branta ruficollis* in “Ujście Warty” National Park. In three of those observations the birds were single while during the fourth one three birds (1 adult and 2 juvenile) were recorded. Most likely all these observations concern the same birds. Until now this species has been recorded only three times in Lubuskie Province. All observations were made at “Ujście Warty” National Park.

Sławomir Rubacha, Olga Krystek

OBSERWACJA GĘSI MAŁEJ *ANSER ERYTHROPUS* NA ZIEMI LUBUSKIEJ

A recording of the Lesser White-fronted Goose *Anser erythropus* in Lubuska Land

26.11.2006 r. w trakcie przeprowadzania kontroli na polach uprawnych przy wsi Pławidło (gm. Słubice) zaobserwowaliśmy dorosłego osobnika gęsi małej *Anser erythropus*. Ptak przebywał w stadzie około 300 gęsi, z trzech innych gatunków: gęsi zbożowych *Anser fabalis*, gęsi białoczelnych *Anser albifrons* oraz bernikli białoliczych *Branta leucopsis*. Ptaka obserwowaliśmy przez około 3 minuty w trakcie żerowania. W momentach zaniepokojenia wysoko podnosił głowę. Ptak był nieco mniejszy w porównaniu do gęsi białoczelnej i zbożowej. Głowa okrągła z wysokim czołem, krótsza szyja. Dziób wyraźnie krótki, pomarańczowy. Biała plama wokół dzioba sięgała aż za czoło. Żółtawa obrączka powiekowa. Przy mniejszych powiększeniach lunety oko wydawało się jasne. Ubarwienie ciała podobne do gęsi białoczelnej. Na brzuchu czarne pasy. Nogi pomarańczowe.

Obserwacja otrzymała akceptację Komisji Faunistycznej.

W okresie powojennym jest to czwarta obserwacja tego gatunku w województwie lubuskim. Pierwsze stwierdzenie miało miejsce 06.02.1982 r. na Odrze k. Pomorska, gdzie widziano dwa osobniki (Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Kolejne obserwacje dotyczą okolic Rogozińca: 18.11.1983 r. – 1 osobnik oraz 19.11.1987 r. – 1 postrzelony ptak (Jermaczek et al. 1995).