

NOTATKI - NOTES

Przemysław Żurawlew

Nowe stanowisko pełnika europejskiego *Trollius europaeus* L. na Wysoczyźnie Tureckiej

A new locality of globe flower *Trollius europaeus* L. in Turecka Plateau

W dniu 19 maja 2009 roku na łące koło miejscowości Kotwasice (gm. Malanów, pow. turecki) (ATPOL: CD58) odkryto nieznanne stanowisko pełnika europejskiego *Trollius europaeus* L.

Godzinna kontrola wykazała dwie kwitnące kępy tej rośliny. W pobliżu zanotowano również ponad 60 kwitnących okazów kukułki szerokolistej *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P. F. Hunt & Summerth. Stanowisko zagrożone jest umiejscowioną w pobliżu trasą motocrossową.

Pełnik europejski jest rośliną objętą ścisłą ochroną w Polsce, występuje w rozproszeniu na całym jej obszarze, największa liczba stanowisk znana jest z części południowo-wschodniej (Zajac i Zajac red. 2001). Notowana na mokrych, torfowiskowych łąkach, w łąkach wysokich bylin, rzadziej na obrzeżach lasów. Na odpowiednich siedliskach często tworzy duże łąny, preferuje gleby próchnicze. W Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i Kujawach gatunek ten został zaliczony do gatunków ustępujących, których populacje, jeżeli nie ustaną przyczyny zagrożeń, w najbliższym czasie trzeba będzie zaliczyć do wymierających (Żukowski i Jackowiak 1995).

Na Wysoczyźnie Tureckiej roślina ta podawana była dotąd z Ewinowa (DD50; nie w DD51!) (Lewandowska 2000) oraz rejonów na wschód od Kalisza (CD67 i CD77) (Zajac i Zajac red. 2001).

LITERATURA

- LEWANDOWSKA D. 2000. Nowe stanowiska roślin chronionych na terenie Nadleśnictwa Turek. Przegl. Przyr., 11, 1: 3-13.
- ZAJĄC A., ZAJĄC M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakł. Prac. Chorol. Komp. Inst. Bot. UJ, Kraków.
- ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. 1995. Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Cz. 1. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Pr. Zakł. Takson. Rośl. UAM, 3: 10-92.

Summary

On 19th May 2009 in meadow near Kotwasice (com. Malanów, district of Turek) (ATPOL: CD58) an unknown location (2 tussocks) of globe flower *Trollius europaeus* L. were observed.

Adres autora:

Przemysław Żurawlew
Kwileń 67a, 63-313 Chocz
e-mail: grusleo@wp.pl

Kamila Misztal

Morski ptak w górach, czyli stwierdzenie biegusa morskiego (*Calidris maritima*) w Sudetach Środkowych

Marine bird in the mountains: observation of the Purple Sandpiper (*Calidris maritima*) in the Central Sudetes.

Dnia 12.XI.2007 r., podczas prowadzenia obserwacji na Zbiorniku Bukówka (gm. Lubawka) w Górach Kamiennych, będących pasmem Sudetów Środkowych stwierdzono biegusa morskiego *Calidris maritima*. Ptak przebywał na północno-zachodnim brzegu zbiornika. Zauważono go, gdy żerował wzdłuż linii brzegowej. Był wyjątkowo niepłochliwy, dzięki czemu można go było obserwować przez ok. 30 min. z odległości zaledwie kilku metrów.

Ptak, nieco większy od biegusa zmiennego (*Calidris alpina*), wyróżniał się przede wszystkim pomarańczowym kolorem nóg i nasady dzioba. Czubek dzioba miał czarny, głowę i kark szare. Dodatkowo na głowie pomiędzy okiem, a nasadą dzioba widniała mało wyraźna biała plamka. Lotki i pokrywy skrzydeł były jasno obrzeżone. Pierś, brzuch i podogonie białe z ciemnymi strychami, gęściej skupionymi na piersi i bokach ciała.

