



Tomasz Ekiert, Radosław Jaros, Grzegorz Wojtaszyn

NIETOPERZE PARKU-ARBORETUM W GOŁUCHOWIE

Bats of arboretum in Gołuchów

ABSTRAKT: W latach 2002-2018 przeprowadzono badania nad składem chiropterofauny na terenie Ośrodka Kultury Leśnej oraz renesansowego zamku w Gołuchowie. Wykazano występowanie 13 gatunków nietoperzy. W okresie letnim licznie stwierdzono borowce wielkie *Nyctalus noctula* oraz nocki rude *Myotis daubentonii*, natomiast w okresie zimowym najliczniej obserwowano nocka Natterera *M. nattereri*. Odnotowano także 3 gatunki z załącznika II dyrektywy siedliskowej: nocka dużego *M. myotis*, nocka Bechsteina *M. bechsteinii* oraz mopka zachodniego *Barbastella barbastellus*. Pozostałe gatunki to nocek Brandta *M. brandtii*, mroczek późny *Eptesicus serotinus*, karlik malutki *Pipistrellus pipistrellus*, karlik drobny *P. pygmaeus*, karlik większy *P. nathusii*, gacek brunatny *Plecotus auritus* oraz gacek szary *P. austriacus*. Przedstawiona w pracy obserwacja nocka Bechsteina dokonana 27.02.2015 jest pierwszym stwierdzeniem tego gatunku w południowej Wielkopolsce.

SŁOWA KLUCZOWE: Chiroptera, nocek Bechsteina, zimowanie, zachodnia Polska

ABSTRACT: During the years between 2002-2018 composition of bat species in the arboretum and the castle of Goluchow village in the South Wielkopolska region was investigated. So far, 13 species of bat have been recorded there: greater mouse-eared bat *Myotis myotis*, Daubenton's bat *M. daubentonii*, Natterer's bat, *M. nattereri*, Brandt's bat *M. brandtii*, Bechstein's bat *M. bechsteinii*, serotine bat *Eptesicus serotinus*, common pipistrelle *Pipistrellus pipistrellus*, soprano pipistrelle *P. pygmaeus*, Nathusius' pipistrelle *P. nathusii*, brown long-eared bat *Plecotus auritus*, grey long-eared bat *P. austriacus*, common noctule bat *Nyctalus noctula* and western barbastelle bat *Barbastella barbastellus*.

KEY WORDS: bats, arboretum, Gołuchów, Bechstein's bat

Wstęp

Stopień zbadania fauny nietoperzy w Polsce jest nierównomierny, z wielu rejonów kraju nadal brak publikowanych danych o ich występowaniu. Jednym z takich miejsc jest obszar parku-arboretum należącego do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie (powiat pleszewski, woj. wielkopolskie). Pomimo dotychczasowych badań przyrodniczych w tym miejscu (Król 1967, Oko 1967, Król i Gostyńska-Jakuszczyńska 2003, Gwiazdowicz i

Mazurczak 2007, Żurawlew 2013) nadal brak dokładnych danych na ten temat. Wstępne badania dotyczące fauny nietoperzy prowadzone były w oddalonym o około 40 km na północ Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym (Łochyński 2001) oraz na terenie Uroczysk Płyty Krotoszyńskiej około 15 km w kierunku wschodnim (Gottfried et al. 2014). Dość dobrze natomiast poznano nietoperze w oddalonej o ok. 40 km na południe wielkopolskiej części Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy (Wojtaszyn 2006).